Jungfernweiss

Vass8R09s106-110

Wtp558

Vass8R09s106-110

P558


OMtp558

Collection Vassal-Montpellier

Junglernweiss 8 Rg s 106-110

Jummhinin

FH





NOM Jung Peruveiss bl EMPLACEMENT 8 R9 s 106-110.

Juntunhinti

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Florais début mi/			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5			53· 53.		14	16	21.5	167	20,7	2317	20 8,90
Pourriture : 0				Mill.	: 0	Port : 100			Vigueur : _3		

olootaalaataalaataalaataal

ANNEE 1391

NOM Jungfernweiss EMPLACEMENT & Rg 9 1/26- 110

Scounce Where Débourrement Nore Perti-Floraison Véraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 1,6 h.6 1/16 3.8 7.8 138 10.9

1 15.3 21.3 2 Grappe G G G P Dim : 15 Compacité : L - N-C

Pour : 0/5 Mill : O

Eaie : TC - G G P Dim : 188/17

disc-sph (21) cv-chov-cyl-fus

Couleur : G Crappe Bus : inc - coloré

Saveur : G - m - ar - fox - herb

Port : euge Vigueur : 2

1992 ANNER											
NOM Jung fernweiss EMPLACEMENT 8 R 9 1 106. 110											
Souche			rrement mi/déb							raison mi/v	Maturité
2 3 4 5	3	13.3 13.3 16.3.4	13,34	4 3 1 0	Baie:	TC - disc-s	ph-ell Gr-Rs- m - a	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dim: /7 bov-cy:	l-fus inc erb	Maturité 10 % 0 : L M C

alantanlantanlantanlantand

N° d'ordre :

Désignation: Jungferniveis (3,107)
Emplacement: 28 Rg s 106-110

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux (90) - sans villosité pubescente 2/78 - sans villosité laineuse 279.

Blanc [91] - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalégs - en gouttiere - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 203 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calver 88

N° d'ordre : Désignation : zunglernweiss. 8 R9s-106-110 (4.2) un feu faible

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

Jungfernweiss 8 R 9 o. 106-110 (0-2)

dantadani,,,,l,,,,t,,,,l,,,,t,ad

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmente.

Lobes : plan - en gouttière - involuté révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 legfer entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 1/14 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Calvo88

Jungfernweiss 8 R90-106-110 A.2 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (dimensions 13 x). Lache 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification (9.) Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 47 x 47). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région embilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134)

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pěpins - apyrène.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse.

Calvo88

olontanlantanlantanland

DENOMINATION: Junglernweiss EMPLACEMENT: 8 R 9 s 106. 110 A.2

SARMENT DE VIGNE

nlandardardardardardard

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :9..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (5) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effecé(2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre :
Désignation : Junglernweus
Emplacement : 8 R 9 A 106 - 110

Juntumlimia

; 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6 : 7 - 8 - 9 Angle des nervures Sexe L_1/L_2 : (10) - (11) L2/L Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües